



City of
Hope®

ORANGE
COUNTY


ЭТО ГЛАВНАЯ НАДЕЖДА

В БОРЬБЕ С РАКОМ ЖЕЛУДКА



City of Hope — это комплексная сеть Национального института онкологии США, предоставляющая жизненно важные методы лечения и проводящая новаторские исследования. Мы хотим повысить осведомленность о профилактике и раннем выявлении заболеваний, чтобы избавиться от онкологических заболеваний в округе Ориндж. Мы предлагаем отдельным лицам и организациям возможность принять участие в предстоящих инициативах по оценке рисков для повышения осведомленности общественности и достижения лучших результатов в диагностике, лечении и выживаемости.

ЧТО ВАМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ЗАНИМАЕТ 4-Е МЕСТО СРЕДИ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН СМЕРТИ ОТ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВО ВСЕМ МИРЕ



Рак желудка развивается, когда клетки в желудке начинают бесконтрольно размножаться

В США РАК ЖЕЛУДКА СЧИТАЕТСЯ «РЕДКИМ» ЗАБОЛЕВАНИЕМ.

27 000+

пациентам ежегодно диагностируют рак желудка

11 000+

человек ежегодно умирают от рака желудка

НО ЧАСТОТА РАКА ЖЕЛУДКА, КАК И ОСТАЛЬНЫХ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, НЕ ОДИНАКОВА У ЖИТЕЛЕЙ США

У ЭТНИЧЕСКИХ МЕНЬШИНСТВ ВЕРОЯТНОСТЬ ДИАГНОСТИКИ РАКА ЖЕЛУДКА ВЫШЕ В 2–14 РАЗ

Самая высокая частота в США регистрируется у мужчин корейского происхождения

Больше диагнозов на поздних стадиях у представителей народа хмонг, латиноамериканцев и чернокожих американцев



Рак желудка чаще встречается у жителей Калифорнии по сравнению с общей популяцией в США

США ОТСТАЕТ ОТ СТРАН АЗИИ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ ОБЩЕЙ ВЫЖИВАЕМОСТИ ПРИ РАКЕ ЖЕЛУДКА



3 из 10

человек в США выживают после диагностированного рака желудка



7 из 10

человек в Азии выживают после диагностированного рака желудка

ПОЧЕМУ ДИАГНОСТИКА ТАК ЧАСТО ЗАТЯГИВАЕТСЯ?

Рак желудка на ранней стадии можно излечить. Неблагоприятные исходы рака желудка обусловлены в основном диагностикой на поздних стадиях.

Ранние стадии рака желудка часто остаются незамеченными:

80% случаев протекают бессимптомно
— И —

МЕНЕЕ ЧЕМ У 5%

пациентов развивается анемия, снижение массы тела и дисфагия

СИМПТОМЫ РАСПРОСТРАНЕННОЙ СТАДИИ


например, утомляемость, снижение массы тела, вздутие живота, боль в животе, потеря аппетита, тошнота, затруднение при глотании и дегтеобразный кал могут остаться нераспознанными

ТАКЖЕ ПРОБЛЕМА В ТОМ, ЧТО

Симптомы игнорируются, отрицаются и (или) неверно трактуются

Имеются препятствия для оказания медицинской помощи, включая языковые барьеры, проблемы с доступностью

БОЛЕЕ ВЫСОКОМУ РИСКУ ПОДВЕРЖЕНЫ:



Лица с активной или предшествующей инфекцией *Helicobacter pylori* (*H. pylori*)



Лица, которые курят и неправильно питаются



Лица, у которых у родителя, брата или сестры, бабушки или дедушки, тети или дяди развился рак желудка



Иммигранты из регионов с высоким уровнем заболеваемости: Восточная Азия, Восточная Европа или Южная Америка



Лица корейского, японского, вьетнамского, китайского, филиппинского происхождения, чернокожие не латиноамериканского происхождения, латиноамериканцы или американские индейцы / представитель коренного населения Аляски

КАКОВЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ?



Скрининг на *H. pylori*: *H. pylori* — это бактерия которая ассоциируется с раком желудка и может быть обнаружена с помощью дыхательной пробы или анализа кала



Эндоскопический скрининг: для этой процедуры используют длинную трубку с миниатюрной видеокамерой для визуального осмотра желудка

ЕСЛИ У ВАС ВЫСОКИЙ РИСК

Следует рассмотреть возможность проведения эндоскопического скрининга и анализа на *H. pylori*.

Ознакомьтесь с дополнительной информацией на веб-сайте **CityofHope.org/OC/OurStomachHealth**

