



City of
Hope®

ORANGE
COUNTY

ՀՈՒՅՍՆ ԱՌԱՋԻՆՆ Է


ՍՏԱՄՈՔՍԻ ՔԱՂՑԿԵՂԻ
ԴԵՊՔՈՒՄ



City of Hope-ը քաղցկեղի դեմ պայքարի ազգային ինստիտուտ է՝ ընդգրկելով քաղցկեղին ուղղված համապարփակ ցանցով, որն ապահովում է կյանքը փրկող բուժումներ և անցկացնում առաջադեմ հետազոտություններ: Ցանկանում ենք բարձրացնել հիվանդությունների կանխարգելման և վաղ հայտնաբերման մասին իրազեկվածությունը՝ նպատակ ունենալով քաղցկեղից զերծ պահել Օրինջ վարչաշրջանը: Անհատներին և կազմակերպություններին առաջարկում ենք հնարավորություն՝ մասնակցելու ռիսկերի գնահատման առաջիկա ջանքերին, բարձրացնելու հանրային իրազեկվածությունը և ախտորոշման, բուժման և վերապրելու հարցում հասնել ավելի լավ արդյունքների:

ԻՆՉ ՊԵՏՔ Է ԻՄԱՆԱՆՔ

ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ ՔԱՂՑԿԵՂԻՑ ՄԱՀՎԱՆ 4 ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ



Ստամոքսի քաղցկեղը, որը նաև հայտնի է որպես ստամոքսային քաղցկեղ, սկսում է, երբ ստամոքսի բջիջները սկսում են անկառավարելի աճել:

ԱՄՆ-ՈՒՄ ՍՏԱՄՈՔՍԻ ՔԱՂՑԿԵՂԸ ՀԱՄԱՐՎՈՒՄ Է «ՀԱՋՎԱԴԵՊ» ԵՐԱՌՈՅԹ:

27,000+

մարդու մոտ ամեն տարի ախտորոշվում է ստամոքսի քաղցկեղ

11,000+


մարդ ամեն տարի մահանում է ստամոքսի քաղցկեղից

ԲԱՅՑ ՄՅՈՒՄ ՔԱՂՑԿԵՂՆԵՐԻ ՆՄԱՆ՝ ՍՏԱՄՈՔՍԻ ՔԱՂՑԿԵՂԸ ՆՈՒՅՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ ՉԻ ԱԶԴՈՒՄ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ԱՄԵՐԻԿԱՅՈՒ ՎՐԱ

**ԷԹՆԻԿ ՓՈՔՐԱՄԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՈՏ
2-14X ԱՎԵԼԻ ՀԱՎԱՆԱԿԱՆ Է, ՈՐ
ԿԱԽՏՈՐՈՇՎԻ ՍՏԱՄՈՔՍԻ ՔԱՂՑԿԵՂ**

Ամենաբարձր հիվանդացությունը գրանցվում է արական սեռի կորեացի ամերիկացիների շրջանում

Ավելի ուշ փուլի ախտորոշումներ են գրանցվում հնոնզգիների, լատինո և սևամորթ ամերիկացիների շրջանում



Ստամոքսի քաղցկեղն ավելի տարածված է կալիֆոռնիացիների, քան ընդհանուր ԱՄՆ բնակչության շրջանում

ԱՄՆ-Ն ԶԻՋՈՒՄ Է ԱՍԻԱԿԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐԻՆ ՍՏԱՄՈՔՍԻ ՔԱՂՑԿԵՂԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՎԵՐԱՊՐԵԼՈՒ ՑՈՒՑԱՆԻՇՈՎ



10-ից 3-ը

ԱՄՆ-ում վերապրում են ստամոքսի քաղցկեղի ախտորոշումից հետո



10-ից 7-ը

Ասիայում վերապրում են ստամոքսի քաղցկեղի ախտորոշումից հետո

ԻՆՉՈՐԻ Է ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀԱՃԱԽ ՈՒՇԱՑՎՈՒՄ:

Վաղ փուլի ստամոքսի քաղցկեղը կարող է բուժվել: Ստամոքսի քաղցկեղի վատ ելքերը մեծապես պայմանավորված են ախտորոշման ուշ փուլերով:

Հաճախ ստամոքսի քաղցկեղի վաղ փուլերը չեն նկատվում:

80%-ն առանց ախտանիշների են — ԵՎ —

5%-ից բզեռի սոս

նկատվում է անեմիա, քաշի կորուստ և դժվարակլանում

ՈՒՇ ՓՈՒԼԻ ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐ

օրինակ՝ հոգնածությունը, քաշի կորուստը, փքվածությունը, որովայնի ցավը, ախորժակի կորուստը, սրտխառնոցը, կուլ տալու դժվարությունը և աղիքային արնահոսությունը կարող են աննկատ մնալ

ՆԱԵՎ ԽՆԴՐԱՀԱՐՈՒՅՑ

Ախտանիշներն անտեսվում են, չեն նկատվում և/կամ սխալ են բուժվում

Առողջապահական արգելքներ, այդ թվում լեզվական, մատչելիության

ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԲԱՐՁՐ ՌԻՍԿԻ ՏԱԿ ԼԻՆԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ.



Ունենալ ակտիվ կամ նախկինում ախտորոշված Հելիկոբակտեր պիլորի (H. pylori) վարակ



Լինել ծխող և վատ սննդակարգով սնվել



Ունենալ ծնող, քույր կամ եղբայր, տատիկ կամ պապիկ կամ մորաքույր/հորեղբայր, ում մոտ ախտորոշվել է ստամոքսի քաղցկեղ



Լինել ներգաղթյալ հիվանդացության բարձր մակարդակ ունեցող տարածաշրջանից՝ Արևելյան Ասիա, Արևելյան Եվրոպա կամ Հարավային Ամերիկա



Լինել կորեացի, ճապոնացի, վիետնամցի, չինացի, ֆիլիպինցի, ոչ լատինամերիկացի սևամորթ, լատինո կամ ամերիկյան հնդկացի/Ալյասկայի բնիկ

ՈՐՈ՞ՆՔ ԵՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ:



Հ. պիլորիի սքրինինգ H. pylori-ն բակտերիա է, որը կապված է ստամոքսի քաղցկեղի հետ և կարող է որոշվել շնչառական կամ կղանքի անալիզով



Էնդոսկոպիկ սքրինինգ այս բուժգործողությունն օգտագործում է փոքրիկ տեսախցիկով երկար խողովակ, որպեսզի տեսողական առումով զննի ստամոքսը

ԵԹԵ ԲԱՐՁՐ ՌԻՍԿԻ ՏԱԿ ԵՔ

Պետք է դիտարկվեն Էնդոսկոպիկ սքրինինգ և Հ. պիլորիի հետազոտությունը:

Մանրամասների համար այցելեք՝ CityofHope.org/OC/OurStomachHealth

